

¿Cáncer o inflamación del páncreas?

Una prueba que identifica a la mayoría de las personas con pancreatitis autoinmune ha sido desarrollada por investigadores italianos

Publicado: Martes 01 diciembre 2009 | 01:33:20 am.

Publicado por: Redacción Digital

Investigadores italianos indicaron que desarrollaron una prueba que identifica a la mayoría de las personas con pancreatitis autoinmune, lo que permitiría a los médicos distinguir más fácilmente la condición del cáncer de páncreas, uno de los tipos de tumor más letales, informa la agencia Reuters.

Pero el método no es perfecto. Si bien da un buen diagnóstico en el 94% de los casos, el 5% de las personas con cáncer pancreático resultan falsos positivos para la condición inflamatoria menos grave.

«Por ello, no puede usarse sola para distinguir la pancreatitis autoinmune del cáncer de páncreas», señaló el equipo del doctor Luca Frulloni, de la Universidad de Verona, en el *New England Journal of Medicine (NEJM)*.

El páncreas produce las hormonas que controlan cómo el cuerpo metaboliza los alimentos. Las personas con pancreatitis autoinmune suelen padecer síntomas como ictericia y dolor abdominal.

Los síntomas de esta enfermedad son similares a los del cáncer de páncreas avanzado y puede resultar difícil, a través de tomografías u otros controles, distinguir ambas enfermedades, manifestó el doctor Antonio Puccetti, de la Universidad de Génova, quien también trabajó en el estudio.

El 10% de los pacientes a los que se remueve el páncreas debido a que se cree que tienen cáncer padecen pancreatitis autoinmune, una condición fácilmente tratable. «Dado que ese padecimiento responde drásticamente al tratamiento con esteroides, el diagnóstico correcto es importante para evitar una cirugía innecesaria en algunos casos», explicó Luca Frulloni.

Por otra parte, el cáncer pancreático puede progresar rápidamente. El temor es que algunas personas con cáncer operable sean tratadas incorrectamente con esteroides pensando que tendrían pancreatitis autoinmune.

«El diagnóstico de cáncer de páncreas debería ser descartado de manera segura antes del uso de tratamiento con esteroides», insistió Frulloni. «Un test diagnóstico es, por lo tanto, de gran importancia desde el punto de vista clínico», añadió.

Los voluntarios de la investigación con otras enfermedades autoinmunes o pancreatitis causada por el alcohol, que es mucho más común, no mostraron evidencia del anticuerpo indicador detectado por el test.

Frulloni dijo que los resultados deben confirmarse y que no hay planes, por el momento, de comercializar la prueba.

<http://www.juventudrebelde.cu/ciencia-tecnica/2009-12-01/cancer-o-inflamacion-del-pancreas>

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana

Copyright © 2017 Juventud Rebelde